

Baccalauréat, série S – La Réunion, correction

29 juin 2010

Exercice 1

6 points

Commun à tous les candidats

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $] -1 ; +\infty[$ par

$$f(x) = 1 + \ln(1+x).$$

On note \mathcal{C}_f sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

On note D la droite d'équation $y = x$.

Partie A

1. (a) Sens de variation de la fonction f :

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} > 0 \text{ sur }] -1 ; +\infty[$$

La fonction f est donc croissante sur $(O; \vec{i}; \vec{j})$

- (b) Limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition :

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow -1^+} 1+x = 0^+ \text{ et } \lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(1+x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} 1+x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+x) = +\infty$$

Tableau de variations de f :

x	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

2. On désigne par g la fonction définie sur l'intervalle $] -1 ; +\infty[$ par $g(x) = f(x) - x$.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) = -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -1} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1} 1 - x + \ln(1+x) = -\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow -1^+} 1+x = 0^+, \lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(1+x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -1} 1-x = 2$$

- (b)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x} = 0 \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} 1+x = +\infty \text{ et } \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x) \left(\frac{1-x}{1+x} + \frac{\ln(1+x)}{1+x} \right) = -\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-x}{1+x} = -1$$

- (c) Sens de variation de la fonction g

$$g'(x) = f'(x) - 1 = \frac{1}{1+x} - 1 = \frac{-x}{1+x} \text{ du signe de } -x \text{ sur }] -1 ; +\infty[$$

La fonction g est donc strictement croissante sur $] -1; 0[$ et strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

Elle possède une tangente horizontale au point d'abscisse 0.

Tableau de variations de la fonction g :

Partie B

Dans cette partie, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

Soit (u_n) la suite définie pour tout nombre entier naturel n par :
$$\begin{cases} u_0 &= 2 \\ u_{n+1} &= f(u_n) \end{cases}$$

1. Pour tout nombre entier naturel n , $2 \leq u_n \leq \beta$. Démonstration par récurrence :

- On a $2 \leq u_0 = 2 \leq \beta$
- Supposons que, pour un n donné, on ait : $2 \leq u_n \leq \beta$, alors, la fonction f étant croissante sur $[2; \beta]$:

$$2 \leq u_n \leq \beta \implies \boxed{2} \leq 2,09861228867 \simeq f(2) \leq f(u_n) = \boxed{u_{n+1}} \leq f(\beta) = \boxed{\beta}$$

- Ainsi, $\forall n, n \in \mathbb{N}$, $2 \leq u_n \leq \beta$.

2. La suite (u_n) est croissante (en utilisant le signe de $g(x)$ étudié plus haut) :

$$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = g(u_n) \geq 0 \text{ sur } [2; \beta]$$

Donc, (u_n) étant une suite croissante et majorée par β , elle est convergente.

Exercice 2

4 points

Commun à tous les candidats

Partie I

On dispose d'un dé cubique A parfaitement équilibré possédant une face verte, deux faces noires et trois faces rouges.

Un jeu consiste à lancer deux fois de suite et de manière indépendante ce dé. On note à chaque lancer la couleur de la face obtenue.

On note V_1, N_1 et R_1 (respectivement V_2, N_2 et R_2) la couleur obtenue au premier (respectivement second) jet.

1. Probabilité pour qu'à l'issue d'un jeu, les deux faces obtenues soient noires :

$$\text{Les deux jets étant indépendants, nous pouvons écrire : } p(N_1 \cap N_2) = p(N_1) \times p(N_2) = \frac{2}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{9}$$

2. Soit l'évènement C : « à l'issue d'un jeu, les deux faces obtenues sont de la même couleur ».

$$p(C) = p(V_1 \cap V_2) + p(N_1 \cap N_2) + p(R_1 \cap R_2) = p(V_1) \times p(V_2) + p(N_1) \times p(N_2) + p(R_1) \times p(R_2) = \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{2}{6}\right)^2 + \left(\frac{3}{6}\right)^2 = \frac{7}{18}$$

3. Probabilité pour qu'à l'issue d'un jeu, les deux faces obtenues soient de couleurs différentes :

$$p(\bar{C}) = 1 - p(C) = 1 - \frac{7}{18} = \frac{11}{18}$$

4. À l'issue d'un jeu, sachant que les deux faces obtenues sont de la même couleur, la probabilité pour que les deux faces obtenues soient vertes :


$$V \subset C \implies C \cap V = V \implies p_C(V) = \frac{p(C \cap V)}{p(C)} = \frac{p(V)}{p(C)} = \frac{\left(\frac{1}{6}\right)^2}{\frac{7}{18}} = \frac{1}{36} \times \frac{36}{14} = \frac{1}{14}$$

Partie II

On dispose d'un second dé cubique B équilibré présentant quatre faces vertes et deux faces noires. Le nouveau jeu se déroule de la manière suivante : on lance le dé B ;

- si la face obtenue est verte, on lance à nouveau le dé B et on note la couleur de la face obtenue ;
- si la face obtenue est noire, on lance le dé A et on note la couleur de la face obtenue.

1. (a) Arbre de probabilités traduisant cette situation. :



(b) Probabilité d'obtenir une face verte au deuxième lancer, sachant que l'on a obtenu une face verte au premier lancer :

$$p_{V_1}(V_2) = \frac{2}{3}$$

2. Probabilité d'obtenir deux faces vertes est égale à $\frac{4}{9}$:

$$p(V_1 \cap V_2) = p_{V_1}(V_2) \times p(V_1) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

3. Probabilité d'obtenir une face verte au deuxième lancer :

$$p(V_2) = p(N_1 \cap V_2) + p(V_1 \cap V_2) = p_{N_1}(V_2) \times p(N_1) + p_{V_1}(V_2) \times p(V_1) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}$$

Exercice 3

5 points

Commun à tous les candidats

Partie A

On cherche à déterminer l'ensemble des fonctions f , définies et dérivables sur l'intervalle $]0; +\infty[$, vérifiant la condition (E) : pour tout nombre réel x strictement positif, $xf'(x) - f(x) = x^2 e^{2x}$.

1. Une fonction f , définie et dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$, vérifie la condition (E), alors la fonction g définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ vérifie, pour tout x de $]0; +\infty[$:

$$g'(x) = \left(\frac{f(x)}{x} \right)' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{x^2 e^{2x}}{x^2} = e^{2x}$$

2. Ensemble des fonctions définies et dérivables sur l'intervalle $]0; +\infty[$ qui vérifient la condition (E) :

$$f \text{ vérifie E} \implies g'(x) = e^{2x} \implies g(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + k = \frac{f(x)}{x} \implies f(x) = \frac{1}{2}xe^{2x} + kx \text{ avec } k \in \mathbb{R}$$

Réciproquement :

$$f(x) = \frac{1}{2}xe^{2x} + kx \implies f'(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + xe^{2x} + k \implies xf'(x) - f(x) = \frac{1}{2}xe^{2x} + x^2e^{2x} + kx - \frac{1}{2}xe^{2x} - kx = x^2e^{2x}$$

3. Fonction h définie et dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$ vérifiant la condition (E) et s'annulant en $\frac{1}{2}$:

$$h\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}e^1 + k\frac{1}{2} = 0 \iff k = -\frac{e}{2} \implies h(x) = \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{e}{2}x$$

Partie B

On considère la fonction h définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par

$$h(x) = \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{e}{2}x = \frac{e}{2}x(e^{2x-1} - 1)$$

On désigne par \mathcal{C} sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. Signe de $h(x)$: x étant positif, $h(x)$ est du signe de $e^{2x-1} - 1$ et, comme la fonction exponentielle est strictement croissante sur \mathbb{R} :

$$e^{2x-1} - 1 \geq 0 \iff e^{2x-1} \geq e^0 \iff 2x-1 \geq 0 \iff x \geq \frac{1}{2}$$

Ainsi :

x	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
Signe de $h(x)$	0	-	+

2. (a) À l'aide d'une intégration par parties :

on pose : $u = x$
 $v'(x) = e^{2x}$, ainsi : $u' = 1$
 $v(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$ et :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} xe^{2x} dx = \left[\frac{1}{2}xe^{2x} \right]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2}e^{2x} dx = \frac{1}{4}e - \left[\frac{1}{4}e^{2x} \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}e - \frac{1}{4}e + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$


Ainsi :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} h(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} xe^{2x} dx - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{e}{2} x dx = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} - \left[\frac{e}{2} \frac{x^2}{2} \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{8} - \frac{e}{16} = \frac{2-e}{16} \approx -0,04489$$

- (b) La fonction h étant négative sur l'intervalle $]0; \frac{1}{2}]$, l'intégrale calculée plus haut est négative.

Ainsi, en unité d'aire, la valeur exacte \mathcal{A} de l'aire de la partie du plan située en dessous de l'axe des abscisses et au dessus de la courbe \mathcal{C} est :

$$\mathcal{A} = \left| \frac{2-e}{16} \right| = \frac{e-2}{16}$$



Exercice 4

5 points

Candidats n'ayant pas choisi l'enseignement de spécialité

Partie I : Restitution organisée de connaissances

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

Soient A, B et C trois points du plan d'affixes respectives a, b, c .

On suppose que A et B sont distincts, ainsi que A et C.

On rappelle que $(\vec{u}, \overline{AB}) = \arg(b - a) \quad [2\pi]$.

$$\begin{aligned} (\overline{AB}, \overline{AC}) &= (\overline{AB}, \vec{u}) + (\vec{u}, \overline{AC}) = -(\vec{u}, \overline{AB}) + (\vec{u}, \overline{AC}) \\ &= -\arg(b - a) + \arg(c - a) = \arg\left(\frac{c - a}{b - a}\right) \quad [2\pi] \end{aligned}$$

Partie II

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

On considère le point A d'affixe $1 + i$.

On associe, à tout point M du plan d'affixe z non nulle, le point M' d'affixe

$$z' = \frac{z - 1 - i}{z}$$

Le point M' est appelé le point image du point M.

1. (a) Affixe du point B' , sous forme algébrique, image du point B d'affixe i :

$$z_{B'} = \frac{i - 1 - i}{i} = \frac{-1}{i} = \frac{-i}{i^2} = i$$

- (b) Pour tout point M du plan d'affixe z non nulle, l'affixe z' du point M' est telle que $z' \neq 1$. En effet :

$$z' = 1 \iff \frac{z - 1 - i}{z} = 1 \iff z - 1 - i = z \iff -1 - i = 0 \quad \text{impossible}$$

2. Ensemble des points M du plan d'affixe $z = x + iy$ non nulle pour lesquels l'affixe du point M' est telle que $|z'| = 1$ est la droite d'équation $y = -x + 1$:

$$\begin{aligned} |z'| = 1 &\iff \left| \frac{z - 1 - i}{z} \right| = 1 \iff |z - 1 - i|^2 = |z|^2 \iff |x + iy - 1 - i|^2 = |x + iy|^2 \\ &\iff (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = x^2 + y^2 \iff x + y - 1 = 0 \iff y = -x + 1 \end{aligned}$$

3. Ensemble des points M du plan d'affixe z non nulle pour lesquels l'affixe du point M' est un nombre réel est la droite (OB) privée de O :

$$z' \in \mathbb{R} \iff \text{Arg}(z') = \text{Arg}\left(\frac{z - 1 - i}{z}\right) = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \iff (\overline{OM}, \overline{BM}) = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \iff O, B \text{ et } M \text{ alignés}$$

